

아래에는 자녀의 의료 기관 방문 시 포함될 수 있는 백신(주사) 및 검진에 대해 설명되어 있습니다.

Molina가 채택한 모든 지침은 미국 소아과 학회(American Academy of Pediatrics), 예방 접종 실무 자문 위원회(The Advisory Committee of Immunization Practices), 미국 예방 서비스 태스크포스(U.S. Preventive Services Task Force) 및 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention)에서 발췌한 것입니다.

B형 간염 백신 - 어린이가 심각한 간 감염에 걸리는 것을 예방하기 위한 일련의 3회 예방 접종입니다. 간 감염은 간 손상, 간암 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

로타바이러스 백신 - 어린 아이들의 심한 설사를 예방하기 위해 여러 차례에 걸쳐 접종되는 예방 주사입니다.

디프테리아, 파상풍, 백일해(DTap) 백신 - 전염성이 높은 세균성 질환인 디프테리아, 파상풍 또는 백일해(DTap)에 걸리지 않도록 여러 차례에 걸쳐 접종되는 예방 주사입니다. 이 백신 접종 전에는 많은 어린이들이 이 감염으로 사망했습니다.

폐렴구균 백신 - 5세 미만 어린이가 폐 감염, 뇌수막염, 혈액 감염, 중이염, 심지어 사망까지 유발하는 질병에 걸리지 않도록 예방하기 위해 여러 차례에 걸쳐 접종되는 주사입니다.

불활성화 소아마비 백신 - 마비 또는 사망을 초래할 수 있는 감염인 소아마비에 걸리지 않도록 여러 차례에 걸쳐 접종되는 예방 주사입니다.

B형 헤모필루스 인플루엔자 백신 - 영유아의 바이러스 감염을 예방하기 위해 여러 차례에 걸쳐 접종되는 예방 주사입니다. 이 주사를 맞지 않으면 어린이는 청각 장애, 뇌 감염 또는 사망에 이를 수 있습니다.

인플루엔자(독감) 백신 - 생후 6개월 이상의 어린이가 독감에 걸리지 않도록 예방하기 위해 매년 접종하는 백신입니다. 매년 가을부터

접종이 시작됩니다. 천식 및 기타 만성 건강 문제가 있는 어린이에게 특히 중요합니다.

홍역, 유행성 이하선염, 풍진 백신 - 어린이의 중이염, 폐렴, 뇌 손상 및 임산부의 유산을 유발할 수 있는 심각한 질병에 걸리지 않도록 여러 차례에 걸쳐 접종되는 예방 주사입니다.

수두 백신 - 어린이가 수두에 걸리지 않도록 예방하는 주사입니다. 일부 어린이는 이 질병으로 인해 폐렴에 걸릴 수 있습니다.

A형 간염 백신 - 어린이가 피부나 눈이 노랗게 변하고(황달) 심한 복통과 설사를 유발할 수 있는 심각한 간 질환에 걸리지 않도록 여러 차례에 걸쳐 접종되는 예방 주사입니다.

인유두종 바이러스(HPV) 백신 - 생식기 사마귀 및 특정 유형의 암을 예방하기 위해 여러 차례에 걸쳐 접종되는 예방 주사입니다. 어린 시절에 접종하면 가장 효과적입니다.

혈액 납 검사 - 12개월과 2세에 실시하는 혈액 검사이며, 최초 검사를 받지 않은 경우 만 3~5세에 캐치업 검사를 실시합니다. 복통, 두통, 학습 장애 및 발작을 유발할 수 있는 어린이의 납 농도가 높은지 검사합니다.

결핵(TB) 검사 - 결핵 위험을 평가하기 위한 일련의 검진입니다. 결핵은 폐, 신장, 척추, 뇌를 공격할 수 있는 세균성 질환입니다. 자녀가 결핵에 걸릴 위험이 있는 경우, 이를 확인하기 위해 혈액 검사나 피부 검사를 실시할 수 있습니다.

이상지질혈증 검사 - 혈액 내 지방(지질)에 대한 일련의 검사로, 9~11세 사이에 혈액 검사를 실시하여 혈액 지방이 많거나 불균형이 있는지 확인합니다.

빈혈 검사 - 생후 12개월에 실시하는 혈액 검사를 포함한 일련의 검사를 통해 낮은 혈구수에 대한 위험을 평가합니다. 혈구 수가 적으면 산소 부족이 발생하여 피곤하거나 쇠약해지는 느낌이 들 수 있습니다.

자폐 스펙트럼 장애(ASD) 선별 검사 - 뇌의 차이로 인해 발생하는 발달 장애인 자폐 스펙트럼 장애(ASD)를 검사하기 위해 실시하는 선별 검사입니다. 자폐성 장애 아동은 사회적 상호작용에 문제가 있는 경우가 많으며 학습, 움직임 또는 주의 집중 방식이 다를 수 있습니다.

산모 우울증 선별 검사 - 출산 후 발생할 수 있는 우울증에 대한 선별 검사를 실시합니다. 임신 중 및 산후 최대 1년까지 여성에게 영향을 미칠 수 있는 다양한 질환을 포함합니다.

발달 검사 - 자녀가 건강하게 성장하고 있는지 확인하기 위해 여러 성장 단계에서 실시하는 선별 검사입니다.

B형 간염 검진 - 출생부터 20세까지 매년 웰 검사 시 B형 간염 위험성을 평가하기 위한 검사를 실시합니다. 이 질병은 간 손상, 간암 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

불소 바니시 - 생후 6개월 또는 발치 1기부터 아이의 치아에 불소 바니시를 도포합니다. 불소 바니시는 충치를 예방하고, 속도를 늦추거나 악화되는 것을 막는 데 도움이 되는 치과 치료법입니다.

구강 건강 - 구강과 치아가 건강하고 적절하게 발달하고 있는지 확인하기 위해 건강한 어린이가 방문하는 동안 구강 육안 검사를 수행합니다. 아이가 생후 12개월까지 치과 진료를 받지 않는 경우, 의사는 정기적인 치과 방문을 위해 치과 홈을 추천해야 합니다.

섭식 장애 검사 - 섭식 장애를 식별하기 위해 10세에서 20세 사이에 실시하는 선별 검사입니다. 섭식 장애는 생명을 위협할 수 있으며 심지어 사망에 이를 수도 있습니다.

웰차일드 검사 - 자녀의 건강 상태를 확인하기 위해 정기적으로 의사에게 검진을 받으러 가야 합니다. 자녀의 주치의는 자녀의 상태, 우려 사항에 대해 부모님과 이야기하고 자녀를 진찰할 것입니다. 또한 자녀가 성장함에 따라 예상되는 중요한 건강 및 안전 정보에 대해 부모님과 함께 검토할 것입니다.



성장 및 건강 유지 지침

(출생 후부터 10세까지)

MolinaHealthcare.com

32119BROMDCAKO
231207



성장 및 건강 유지 지침(출생 후부터 10세까지)

아이를 키우는 것은 정말 힘든 일입니다! 언제 병원에 데려가야 하는지 판단하는 것은 다소 혼란스러울 수 있습니다. 자녀가 건강하게 자랄 수 있도록 이 가이드를 따르십시오!



	출생	1개월	2개월	4개월	6개월	9개월	12개월	15개월	18개월	2세	30개월	3세	4세	5세	6세	7~10세
B형 간염 백신	1차 접종	2차 접종			3차 접종											
로타바이러스			1차 접종	2차 접종	3차 접종(3회 연속 접종인 경우)											
디프테리아, 파상풍, 백일해(DTap)			1차 접종	2차 접종	3차 접종		4차 접종						5차 접종			
폐렴구균			1차 접종	2차 접종	3차 접종		4차 접종 (4회 연속 접종인 경우)									
불활성화 소아마비 백신			1차 접종	2차 접종	3차 접종								4차 접종			
헤모필루스 인플루엔자 B형			1차 접종	2차 접종	3차 접종		4차 접종(4회 연속 접종인 경우)									
인플루엔자(독감)							독감 예방 주사 - 매년(6개월부터 시작) - 독감 시즌									
홍역, 유행성 이하선염, 풍진							1차 접종						2차 접종			
수두							1차 접종						2차 접종			
A형 간염							1차 접종		2차 접종							
인유두종 바이러스(HPV)																1차 접종 (9~10세)
혈액 납 검사							테스트			테스트		캐치업 테스트				
결핵												웰 검사당 한 번				
이상지질혈증										검진			검진		검진	9~11세 사이에 테스트
빈혈				검진			테스트					웰 검사당 1회 검사				
자폐 스펙트럼 장애 검사																
산모 우울증 검사																
발달 검사																
B형 간염 검진																
섭식 장애 검사																10세 시점 검진
웰차일드 검사																
불소 바니시									3~6개월에 한 번							
구강 건강									정기적으로 치과를 방문하기							