

以下描述的是您孩子就診時可能包含的疫苗(注射)和篩檢。

Molina 採用的所有指南均來自美國兒科學會、免疫實踐諮詢委員會、美國預防服務工作小組以及疾病管制與預防。

白喉、破傷風、百日咳疫苗 (DTap) – 系列預防兒童感染高度傳染性細菌性疾病白喉、破傷風或百日咳(百日咳)的疫苗。在出現這些疫苗之前,許多兒童都死於此類感染。

腦膜炎雙球菌疫苗 – 系列疫苗,預防兒童感染血液或腦膜炎(大腦周圍組織感染)或兩者兼具。這是一種傳染性很強的疾病,可能會危及生命。

流行性感冒(流感)疫苗 – 每年注射一次,以預防 6 個月及以上的兒童感染流感。每年秋季開始提供。對於患有氣喘和其他慢性健康問題的孩子尤其重要。

人類乳突病毒 (HPV) 疫苗 – 系列預防尖銳濕疣和某些類型癌症的疫苗。在童年時期接種最有效。第 1 劑在兒童 9-10 歲接種。

乙型肝炎 – 從出生到 20 歲的每次健康檢查都會進行評估乙型肝炎風險的篩檢。這種疾病可能導致肝損傷、肝癌或死亡。如果孩子沒有接種此系列疫苗預防此疾病,則會進行補充接種。

丙型肝炎 – 針對由攻擊肝臟並導致嚴重肝臟腫脹和損傷的病毒引起的感染進行的篩檢。

結核病 (TB) – 評估 TB 風險的一系列篩檢。結核病是一種細菌性疾病,會侵襲肺部、腎臟、脊椎和腦部。如果您的孩子有 TB 的風險,可以進行血液或皮膚測試來檢查。

血脂異常 – 對血液中的脂肪(脂質)進行一系列篩檢,在 9 至 11 歲之間進行血液檢查,以發現脂肪含量過高或不平衡的情況。

貧血 – 系列篩檢,在 12 個月大時進行血液檢查,以評估血球計數低的風險。這可能會導致缺氧,讓您感到疲倦或虛弱。

菸草、酒精或藥物使用評估 – 專為 12-20 歲兒童設計的物質使用篩檢。此評估檢查使用這些物質是否存在風險因素,以便醫生可以在需要時轉介幫助您的孩子戒掉這些物質。

憂鬱症篩檢 – 發現、評估和管理 12-20 歲兒童憂鬱症的篩檢。

自殺風險篩檢 – 識別可能表明自殺風險的行為或情緒的篩檢。然後,醫生可以轉介以幫助您的孩子。

性傳播感染 – 確定梅毒、披衣菌、淋病和疱疹等性傳播感染風險的篩檢。然後,醫生可以在必要時對您的孩子進行檢查和治療。

HIV – 在 11 歲至 20 歲之間進行篩檢,以識別攻擊人體免疫系統的 HIV 病毒的風險。篩檢後,有感染 HIV 風險的青少年應該接受檢測。如果 HIV 不治療,可能會導致 AIDS(愛滋病)。

心臟驟停/死亡 – 評估 11-20 歲兒童心臟驟停和心臟性猝死的風險。如果有任何疑慮,醫生可以轉介給心臟專家進行更多檢查。

飲食失調篩檢 – 在 10 至 20 歲之間進行篩檢,以識別飲食失調。這可能會危及生命,甚至導致死亡。

青少年健康檢查 – 當您的孩子進入青少年期時,需要特別關注對青少年重要的問題。這些話題包括他們在學校的表現、他們是快樂或沮喪以及有關於草、藥物或酒精使用的問題。醫生通常會要求您在就診的第一階段在外面等待,然後讓您加入,以便您和您的孩子可以討論應該共同商討的事情。



促進健康和保健指南

(11 至 20 歲)

MolinaHealthcare.com

32128BROMDCATW
231207



促進健康和保健指南 (11 至 20 歲)

養育青少年可能很辛苦!可能不太清楚何時帶孩子去看醫生。遵循本指南,幫助您的孩子健康成長!



	11 歲	12 歲	13 歲	14 歲	15 歲	16 歲	17 歲	18 歲	19 歲	20 歲
破傷風、白喉、百日咳疫苗 (TDap)	第 1 劑									
腦膜炎雙球菌疫苗	第 1 劑					第 2 劑				
流行性感冒 (流感) 疫苗	流感疫苗 - 每年 - 流感季節									
人類乳突病毒 (HPV) 疫苗						第 2 劑				
乙型肝炎	每次健康檢查篩檢一次									
丙型肝炎								每次健康檢查篩檢一次		
結核病	每次健康檢查篩檢一次									
血脂異常	每次健康檢查篩檢一次 - 在 17-20 歲之間進行檢測									
貧血	每次健康檢查篩檢一次									
菸草、酒精或藥物使用評估	每次健康檢查篩檢一次									
憂鬱症篩檢		每次健康檢查篩檢一次								
自殺風險篩檢		每次健康檢查篩檢一次								
性傳播感染	每次健康檢查篩檢一次									
HIV	每次健康檢查篩檢一次 - 在 15-20 歲之間進行檢測									
心臟驟停/死亡	每次健康檢查篩檢一次									
飲食失調篩檢	每次健康檢查篩檢一次									
健康檢查	青少年健康檢查 - 每年一次									